

## Le cycle du frelon

Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
	Phase N°1										
		Phase N°2									
					Phase N°3						
								Phase N°4			
<b>Phase N°1</b>		<p><b>Piégeage des fondatrices :</b> Le piégeage doit aller <b>de la mi-février à mai, voire fin mai.</b> Les fondatrices sortent de leur refuge, pas toutes ensemble, mais en fonction de la climatologie du moment et de l'endroit où elles ont passé l'hiver. A partir de leur sortie, elles cherchent à s'alimenter et à construire un nid.</p>									
<b>Phase N°2</b>		<p><b>Recherche des nids primaires :</b> Entre le <b>1er Avril et la fin juin</b>, c'est la recherche et la destruction des nids primaires. La reine a bâti les premières cellules : elle a pondu des oeufs qui vont permettre l'éclosion des premières ouvrières.</p>									
<b>Phase N°3</b>		<p><b>Recherche des nids secondaires :</b> A partir de <b>début juillet</b>, la colonie se développe et le nid augmente rapidement de volume. Les ouvrières de plus en plus nombreuses bâtissent et recherchent de la nourriture pour les larves et la fondatrice, substances sucrées et les parties riches en protéines (abeilles et autres insectes). C'est à partir de la <b>mi-juillet</b> que l'on voit arriver les frelons devant les ruches. Il est recommandé aux apiculteurs de réduire les entrées des ruches à partir du <b>1er août</b>, pas avant pour ne pas gêner les faux bourdons.</p>									
<b>Phase N°4</b>		<p><b>La chasse aux fondatrices :</b> A partir de <b>mi-septembre jusqu'à fin novembre</b>, C'est la chasse qui recommence sérieusement et doit s'intensifier pour les ouvrières mais aussi pour les nouvelles reines qui sont sorties du nid et vont s'accoupler. Difficile de les différencier avec les ouvrières qui sont souvent à cette époque d'un calibre supérieur parce bien alimentées. Cette façon de procéder doit permettre de réduire le nombre de fondatrices au printemps suivant.</p>									

Raymond Saunier